

# ورقة المعلومات

## كوكاتو بودين

### *Calyptorhynchus baudinii*

#### الاسماء الاخرى

كوكاتو بودين الاسود والكوكاتو الاسود طويل المنقار. سمي كذلك تكريما للمستكشف الفرنسي نيكولاس بودين (1754 - 1803)

#### حالة التهديد

مدرج في القائمة الحرجة: جدول رقم 1 - قانون الحفاظ على الحياة البرية في استراليا الغربية مهدد بالانقراض: بموجب قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي الفدرالي

يتواجد بشكل نادر الى شائع نسيبا (أقصى الجنوب الغربي الأكثر عددا). يتواجد عادة في أسراب تصل إلى (300 طائر)، وفي بعض الاحيان في تجمعات أكبر تصل إلى (1200 طائر) في المجامع. وقد تناقص عدده خلال الخمسين سنة الماضية كما حال انخفاض معدل انجابها (0.6 فرخ في السنة) دون استبدال الأعداد الكبيرة التي يطلق عليها المزارعين النار.

#### الوصف

يتراوح الطول بين 50 - 60 سم والوزن بين 560 - 770 غم المنقار العلوي أضيق وأطول من منقار كوكاتو كارنيبي الذكر البالغ: عموما أسود اللون مائل للبنى واطراف الريش موشحة باللون الابيض القاتم معطيا مظهرا صدفيا. كواسي الأذن لونها ابيض قاتم وهناك شريطا ابيضا مشقوقا بالوسط يمتد باتجاه طرف الذيل. والمنقار أسود اللون والجلد العاري حول العين وردي اللون. الأنثى: مشابهة للذكر لكن تختلف عنه بان لون كواسي الأذن ابيضا مصفرا فاقعا، والمنقار رمادي اللون بطرف اسود وجلد العين رمادي اللون.

#### النداء

تغريدة قصيرة "ويشر ويشر" أو نداء السرب "باينب باينب". نداء التزاوج "أر" منخفضة ومتكررة تتبعها صافرة ذات نبرة عالية.

#### التكاثر

يعشش في تجاويف جذوع اشجار الكاري والمري والواندو والتيوارت والبولش. ويوضع البيض من شهر آب إلى كانون الأول وتضع الأنثى بيضة أو بيضتين. (يتم تربية فرخ واحد فقط) والأنثى فقط تحتضن وتربي الفرخ.

متوسط العمر ما بين 25 - 50 سنة

#### التوزيع

يتواجد في مناطق الجنوب الغربي الرطبة وشبه الرطبة. شمالا الى قُدجي قَنَب Gidgegannup وشرقا الى كلاك لاين وونديرنغ وكويندانيغ ونهر بيرب وبحيرة موير ونهر كينغ، ومن الغرب الى الشريط الشرقي لسهل سوان الساحلي بما في ذلك غرب ميلاند وجوزنلز وبايفورد وشمال دنلوب وبارلوب ووكالب وبانبري وكذلك سلسلة جبال ستيرلنج وبورونجرب وعلى طول الساحل الجنوبي حتى واتشينيغ. وهو مستوطن في استراليا الغربية.

#### الموئل والغذاء

غابات اليوكالبيت الجنوبية التي تنمو فيها اشجار الجرا والمري والكري خاصة. وتتغذى على بذور الكينا والبانكزيا والهاكيا واشجار التفاح والاجاص المثمرة. وتتغذى أيضا على الرحيق والبراعم والأزهار وشرائح لحاء الأشجار الميتة بحثا عن يرقات الخنفساء. والأعلاف المتواجدة في كافة المستويات من المظلات الى الأرض.



أنثى (يمين) ، ذكر (يسار)



ذكر بالغ



أنثى بالغة

## الأخطار التي تهدد الأنواع

إقتلاع الغابات والحرائق وضربات المركبات ونحل العسل الأوروبي الوحشي الذي يستولي على تجاويف الأعشاش. قتلت في السابق أعداد كبيرة منه بالرصاص على أيدي المزارعين. وما زال إطلاق النار غير الشرعي يمارس.

## المراجع

Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998). *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 278–280.

Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (2008). Distribution, status, social organisation, movements and conservation of Baudin's Cockatoo (*Calyptorhynchus baudinii*) in South-west Western Australia. *Records of the Western Australian Museum* 25: 107–118.


الصورة: توني كيبري  
الترجمة: خلود طوطج  
تصميم التنسيق: كيم سارتي



أنثى كوكاتو بودن في العش



جوز المرّي ممضوغا من قبل كوكاتو بودن



التوزيع الحالي في جنوب غرب أستراليا الغربية