



简介

Baudin's Cockatoo 鲍丁凤头鹦鹉

Calyptorhynchus baudinii



雄(左), 雌(右边)

其他名称：

鲍丁黑凤头鹦鹉，长嘴黑凤头鹦鹉
为纪念法国探险家尼古拉斯·鲍丁（1754–1803）而命名。

受威胁状态：

“列入濒危：表 1—《西澳大利亚野生动物保护法》”

“濒危：根据《联邦环境保护与生物多样性保护法》”

自稀少到中度常见（西南深处最多）。成群分布（可达 300 只），偶尔在其栖息地见有更大的集群（高达 1200 只）。此物种在过去的 50 年间数量下降，较低的繁殖率（0.6 只雏鸟每年）使其难以从果园主的枪炮下恢复种群数量。

描述：

上喙较卡拉比鹦鹉更狭长。

成年雄鸟：多棕黑色，羽缘灰白使其呈现波浪形；耳羽灰白色；白色尾羽贯穿尾部，在中部中断；喙黑色，眼缘裸露皮肤粉红色。

雌鸟：与雄鸟类似，但耳羽呈现较明亮的黄白色；喙灰色，喙端色深，眼缘皮肤灰色。



成年雄鸟

鸣声：

一短“whicher whicher”伴随着多声“bunyip bunyip”。繁殖时期的鸣声是一段重复的低音“arr”后跟随者一段高亢的哨音。

繁殖：

在考里木、美叶桉、Wandoo、Tuart 和 Bullich 的树洞中筑巢。于八月至 12 月间产卵，每窝 1-2 枚（只有 1 只幼鸟被哺育），雌鸟孵卵并哺育雏鸟。


寿命：25–50 年。

分布：

分布于西南湿润和半湿润地区，北至 Gidgegannup，东至 Clackline、Wandering、Quindanning、Perup 河、Muir 湖、King 河，西至 Swan Coastal Plain 的东缘，包括西 Midland、戈斯内尔斯、拜福德、北 Dandalup、Yarloop、Wokalup 和 Bunbury，以及斯特灵和 Porongurup Ranges，并且沿着 Waychinicup National Park 的南岸。该物种是西澳大利亚的本地种。

栖息地与食性：

分布于南部桉树林中，主要有红柳桉树、美叶桉和考里木。取食桉树、Banksia(拔克西木属)、Hakea(哈克木属)植物、以及苹果和梨的种子。也取食花蜜、花芽和花朵，并会剥离死亡植株的树皮寻觅甲虫的幼虫。取食范围自树冠至地面遍及所有高度。



成年雌鸟



雌性鲍丁凤头鹦鹉在巢中

所受威胁：

森林砍伐，火灾，来自交通工具的伤害，占领其筑巢树洞的天敌蜂类，以及过去来自果园主的大量捕杀。

参考文献：

Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998). *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 278–280.


Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (2008). Distribution, status, social organisation, movements and conservation of Baudin's Cockatoo (*Calyptorhynchus baudinii*) in South-west Western Australia. *Records of the Western Australian Museum* **25**: 107–118.

Images: Tony Kirkby Layout design: Kim Sarti

图片：托尼·柯克比 版面设计：金·萨尔蒂



被鲍丁凤头鹦鹉啄食的美叶桉果实



在西澳大利亚西南部的现有分布