


Page d'informations

Le Cacatoès de Baudin

Calyptrorhynchus baudinii



Mâle (gauche), Femelle (droite)



Mâle adulte



Femelle adulte

Autres noms:

Le Cacatoès noir de Baudin et le Cacatoès noir à long bec. Nommé ainsi en l'honneur du grand explorateur français Nicolas Baudin (1754–1803).

Situation de l'espèce menacée:

"Listé Endangered: Schedule 1 – Western Australian Wildlife Conservation Act".

"Endangered: sous *Federal Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act*".

Rare à modérément commun (les plus nombreux dans l'extrême Sud-Ouest); principalement en volées (jusqu'à 300); parfois en plus grands groupes (jusqu'à 1200) au perchoir. Leur nombre a décliné pendant les 50 dernières années et le taux faible de reproduction (0,6 oisillon par année) empêche de remplacer le grand nombre d'oiseaux tués par les fruiticulteurs.

Description:

Longueur 50–60 cm. Poids 560–770 g.

Le bec supérieur est plus étroit et plus long que celui du Cacatoès de Carnaby.

Mâle adulte: pour la plupart d'un noir brunâtre; les plumes sont bordées de blanc bistré ayant l'air d'une bordure festonnée; les couvertures auriculaires blanches bistrées, une bande blanche vers le bout de la queue interrompue au milieu, bec noir, la peau nue autour des yeux rose.

Femelle: comme le mâle mais les couvertures auriculaires d'un blanc jaunâtre plus brillant, bec grisâtre avec le bout foncé et la peau autour des yeux grise.

Le cri:

Un court cri de volée "ouitcheu ouitcheu" et "beunyip beunyip". Le cri de reproduction; un "ahh" de ton bas répété suivi par un sifflement de ton haut.

Reproduction:

La construction des nids dans les niches des arbres Karri, Marri, Wandoo et Bullich. La ponte des œufs août - décembre; 1–2 œufs (un oisillon seulement est élevé) et seule la femelle couve l'oisillon.

Durée de vie: 25–50 ans.

Répartition:

Ils se trouvent dans les zones humides et sub-humides du Sud-Ouest, au Nord jusqu'à Gidgegannup; à l'Est jusqu'à Clackline, Wandering, Quindanning, la rivière de Perup, au lac de Muir et à la rivière de King et à l'Ouest jusqu'à la bande Est de la plaine littorale de la rivière du Swan; inclus Midland Ouest, Gosnells, Byford, Dandalup Nord, Yarloop, Wokalup et Bunbury et les chaînes du Stirling et Porongurup puis suivant la côte Sud jusqu'au parc national de Waychinicup. C'est endémique de l'Australie occidentale.



Cacatoès de Baudin femelle dans le nid

Habitat et nourriture:

Les forêts d'Eucalyptus du Sud; principalement de Jarrah, Marri et Karri. Se nourrissent des graines d'Eucalyptus, Banksia, Hakea et de pommes et poires en saison. Aussi de nectar, de bourgeons et de fleurs et ils arrachent des bandes d'écorce des arbres morts pour chercher des larves de coléoptères. Ils fourragent à tous niveaux de la canopée jusqu'au sol.

Menace de l'espèce:

Le défrichement de la forêt; les feux, l'impact des voitures; les abeilles sauvages qui envahissent les niches normalement utilisées pour la construction des nids. Dans le passé un grand nombre de Cacatoès de Baudin avaient été tués par les fruiticulteurs.

Références:


Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998). *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 278–280.

Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (2008). Distribution, status, social organisation, movements and conservation of Baudin's Cockatoo (*Calyptorhynchus baudinii*) in South-west Western Australia. *Records of the Western Australian Museum* **25**: 107–118.

Traduction: Marion B.



Les noix de Marri grignotés par le Cacatoès de Baudin



La répartition actuelle dans le Sud-Ouest de l'Australie occidentale