

ورقة المعلومات

كوكاتو كارنبي

Calyptorhynchus latirostris

الاسماء الاخرى

كوكاتو كارنبي الاسود والكوكاتو الاسود قصير المنقار. سمي كوكاتو كارنبي تكريما لعالم البيوض والطبيعة إيفان كارنبي (1908 – 1974)

حالة التهديد

مدرج في القائمة الحرجة: جدول رقم 1 - قانون الحفاظ على الحياة البرية في استراليا الغربية مهدد بالانقراض: بموجب قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي الفدرالي يتواجد بشكل غير شائع الى شائع في المناطق الرطبة من النطاق ، نادر التواجد وموزع بشكل غير مستقر في الاجزاء الجافة . يتواجد عادة على شكل أزواج أو أسراب صغيرة، وفي بعض الاحيان كأسراب كبيرة او تجمهرات تصل الى حد 5000 طائر في غير مواسم التزاوج خاصة في مزارع الصنوبر. وقد تناقص عدده خلال الخمسين سنة الماضية بسبب فقدان وتدمير الموئل خاصة إزالة الموئل على نطاق واسع في معظم مناطق الويت بيلت وغابات بانكزيا وتيوارت في سهل سوان الساحلي.

الوصف

يتراوح الطول بين 53 – 58 سم والوزن بين 500 – 790 غم المنقار العلوي أوسع وأقصر من منقار كوكاتو بودين الذكر البالغ: عموما أسود اللون مائل للبنى واطراف الريش موشحة باللون الابيض القاتم معطيا مظهرا صديقا. كواسي الأذن لونها ابيض قاتم وهناك شريطا ابيضا مشقوقا بالوسط يمتد باتجاه طرف الذيل. والمنقار أسود اللون والجلد العاري حول العين وردي اللون. الأنثى: مشابهة للذكر لكن تختلف عنه بان لون كواسي الأذن ابيضا مصفرا ، والمنقار ابيضا رمادي أو رمادي بطرف اسود وجلد العين رمادي اللون .

النداء

تغريدة قصيرة وي يو – وي يو أو نداء السرب وي لوو - وي لوو

التكاثر

يتكاثر بشكل رئيس في منطقة الويت بيلت في تجاويف جذوع اشجار الكينا القديمة ذات اللحاء الناعم بما في ذلك شجر الواندو والسالمون جَم وتيوارت وفَلْدُ جَم والكاري إضافة إلى شجر البولش والمَرِي. ويوضع البيض على غبار او رقائق الخشب في أسفل التجويف من أوائل شهر تموز إلى كانون الأول وتضع الأنثى بيضة او بيضتين. ويتم عادة تربية فرخ واحد فقط والأنثى فقط تحتضن وتربي الفرخ .

متوسط العمر ما بين 25 – 50 سنة

التوزيع

يتواجد في الجنوب الغربي الى الشمال من منطقة ميرتشيوسون السفلى وشرقا الى نياوى وويلروي وغاية ودي ومانمانينج ودوروكوبين وبحيرة كرونين والى الشرق قليلا من كوندنجن. وهو مستوطن في استراليا الغربية.

الموئل والغذاء

أحراج وشجيرات داخل استراليا الغربية شبه القاحل. تنتقل في غير موسم التزاوج على شكل أسراب الى المناطق الساحلية خاصة مزارع الصنوبر وأحراج بانكزيا. ويشمل الغذاء ازهار ورحيق وبذور البانكزيا ودرايندرا وهاكياوالكينا و كوريمييا و جريفيليا وايضا بذور الصنوبر واشجار الجوز المثمرة خاصة اللوز والمكاديميا ولب وعصير التفاح والبيرسيمون ويرقات الحشرات.



أنثى (يمين) ، ذكر (يسار)



ذكر بالغ



أنثى بالغة

الأخطار التي تهدد الأنواع


تشمل الأسباب المباشرة لتناقص المجموعات تدهور الأراضي وتجزئة الموئل (خاصة في نطاق الويت بلت)، وفقدان الأشجار ذات التجاويف وأثر المنافسين على التجاويف بما في ذلك الجاله والكوريلاس ونحل العسل الاوروبي والوحشي والحرائق وضربات المركبات ايضا.

المراجع

Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998). *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 276–280.

Johnstone, R., Kirkby, T., Stone, P., Minton, C. (2005). White-tailed Black-Cockatoos: Identification Challenges and Changes in Distribution and Status, and links with a Community Program – Cockatoo Care. In Gole, C. (Ed.). *Carnaby's Black-Cockatoo Future Directions Symposium 2003*. Birds Australia WA, Perth.


الصورة: توني كيبيري تصميم التنسيق: كيم سارتي
الترجمة: خلود طوطج



أنثى كوكاتو كارني في العش



جوز المرّي ممضوغا من قبل كوكاتو كارني



التوزيع الحالي في جنوب غرب أستراليا الغربية