



简介

Carnaby's Cockatoo 卡拉比鹦鹉


Calyptorhynchus latirostris



雄 (左), 雌 (右边)



成年雄鸟



成年雌鸟

又名 :

卡拉比黑葵花鹦鹉，或短嘴黑凤头鹦鹉。为纪念动物学家和博物学家 Ivan Carnaby(1908–1974)而命名。

受胁等级 :

根据西澳大利亚野生动物保护条例-目录 1 : 濒危 :

根据联邦环境保护和生物多样性保护条例 : 濒危

介于不常见至常见之间，常见于湿润地区，零星点状分布于干旱地区。常成对或小群活动，偶或集大群；非繁殖季中可见多达 5,000 只个体的大群，喜在针叶林中活动。该种在过去的 50 年中数量持续下降，主要原因是栖息地丧失和破坏，特别是斯旺滨海平原大面积的对小麦生长带的清除以及班克木和桉树林的砍伐。

形态描述 :

体长 53–58 cm，重 500–790 g。

上喙较鲍丁黑凤头鹦鹉 (*Calyptorhynchus baudinii*) 宽且短。

成年雄性：体羽棕黑色，羽毛末端暗白色，形成扇形斑纹；耳羽暗白色；尾具白色条带，宽几近尾端，于白带中间断开；嘴黑色；眼周裸皮粉色。

雌性：似雄性，但耳羽黄白色；嘴灰白色或灰色，端部黑色；眼周裸皮灰色。

叫声：短促的“weeyou-weeyou”或“weeloo-weeloo”声。

繁殖 :

主要繁殖于小麦生长带，在老龄的、树皮光滑的桉树洞中营巢，主要是红皮桉和鞣桉，在棒头桉、巨桉和美叶桉的树洞中也有筑巢。卵产在洞底的木屑或小木片上，产卵期自 7 月上旬到 12 月。窝卵数 1-2 (通常 1 只成活)，雌鸟孵卵、育雏。

寿命：25–50 年

分布 :

分布于澳洲西南部，北至 Murchison 低处，东至 Nabawa、Wilroy、Waddi 森林、Manmanning、Durokoppin、Cronin 湖，及 Condingup 的东部，是西澳特有种。

生境和食物 :

非繁殖季节集群活动于西澳内陆半干旱地区至滨海区域的林地和灌丛，特别是针叶林和班克木林地。食物组成包括 Banksia, Dryandra, Hakea, Eucalyptus, Corymbia, Grevillea 的花、花蜜和种子，还有松子、干果树种 (特别是杏和澳洲坚果) 的种子、苹果和柿子的果肉和果汁，以及昆虫的幼虫。



雌性卡拉比鹦鹉在巢中

威胁：

导致种群下降的直接原因是栖息地丧失和生境破碎化（尤其是小麦生长带），树洞（老龄树）的减少，以及树洞竞争者的影响，如粉红凤头鹦鹉、凤头鹦鹉和欧洲野蜜蜂，此外还有火灾、交通意外等原因。

参考文献：

Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998). *Handbook of Western Australian Birds. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird)*. Western Australian Museum pp. 276–280.

Johnstone, R., Kirkby, T., Stone, P., Minton, C. (2005). White-tailed Black-Cockatoos: Identification Challenges and Changes in Distribution and Status, and links with a Community Program – Cockatoo Care. In Gole, C. (Ed.). *Carnaby's Black-Cockatoo Future Directions Symposium 2003*. Birds Australia WA, Perth.

图片: Tony Kirkby 设计: Kim Sarti



被卡拉丁鹦鹉啄食的美叶桉果实



在西澳西南地区的现有分布