

ورقة المعلومات

الكوكاتو الأسود ذو الذيل الأحمر

Calyptorhynchus banksii naso

الأسماء الأخرى

الكوكاتو الأسود ذو الذيل الأحمر
وقد أطلق جون جولاد عام 1837 على سكان الجنوب الغربي اسم "الناسو" (نسبة إلى منقاره الضخم). ويعرف عند شعب النونجار باسم "كاراك".

حالة التهديد

مدرج في القائمة الحمراء: جدول رقم 1 - قانون الحفاظ على الحياة البرية في أستراليا الغربية مهدد بالانقراض: بموجب قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي الفدرالي.

وقد كان شائعاً في السابق، لكنه الآن نادر إلى غير شائع وموزع بشكل غير مستقر على نطاق أصح منخفاً بشكل ملحوظ. يتواجد عادة على شكل أزواج أو أسراب صغيرة، نادراً بأسراب كبيرة (تصل إلى 200). وقد تناقص بسبب تدمير الغابات والأراضي الحرجية، والمنافسة على تجايف الأعشاش مع الأنواع المحلية والأجنبية أيضاً، وتأثير الحرائق. هناك ثلاث فصائل فرعية من الكوكاتو الأسود ذو الذيل الأحمر في أستراليا الغربية (انظر الخريطة). وسكان الجنوب-الغربي "الناسو" هم فقط المدرجون كمهددون بالانقراض.

الوصف

يتراوح الطول بين 53 - 55 سم والوزن بين 600-610 غم.

الذكر البالغ: أسود لامع ما عدا شريط أحمر-برتقالي باهت باتجاه طرف الذيل، والمنقار رمادي داكن أو مسود.

الأنثى: أسود لامع، الرأس وأغطية الجناح مبرقعة بأصفر باهت، الصدر والبطن موشح بخطوط برتقالي-أصفر والذيل عليه شريط ضيق برتقالي-أصفر (العالب برتقالي) على أغطية أسفل الذيل، المنقار أبيض رمادي باهت.

الأحداث وغير البالغين: على غرار الأنثى باستثناء البقع الصفراء الباهتة على الرأس والخددين والأجنحة فهي أقل، خطوط كنيبة باهتة صفراء على الصدر والبطن، وريش الذيل الخارجية مخططة بألوان زاهية من الأحمر أو البرتقالي المحمر (قليلاً من الأصفر أو بدون) والمنقار رمادي داكن أو مسود.

النداء

صيحات عالية خشنة "كاربي"، "كاراك" أو "كرار-راك" وأيضاً أصوات "تتت" وصغير أنأي خشن. نداءات الذكر للتزاوج عبارة عن تكرار ميكانيكي لصوت "وا - وا".

التكاثر

يعشش في تجايف جذوع أشجار القري والجرّا والواندو والكاري والبولش. يوضع البيض على رقائق الخشب في أسفل التجويف من شهر آذار إلى كانون الأول وتضع الأنثى بيضة (نادراً بيضتين). فترة الحضانة من 29 - 31 يوم والأنثى فقط تحتضن وتربي الفرخ. الفقص يكون مغصى بريش أصفر متناثر.

متوسط العمر: 25 - 50 سنة



حدث (يمين)، أنثى (وسط)، ذكر (يسار)



ذكر بالغ



أنثى بالغة

التوزيع

تتواجد هذه الفصيلة في مناطق الجنوب الغربي الرطبة وشبه الرطبة، بشكل رئيسي في مرتفعات الداخل، إلى الشمال من دجن دجن (دندراجان Dandaragan سابقا) وإلى الشرق من ماونت هيلينا (تودياي Toodyay سابقا)، كريسماس تري ول، بالقرب من بروكوتون ونورث بانبيستر (وانديرينج سابقا) وماونت سايدلياك وكودجوتب وروكي جلي وأعلى نهر كينج وإلى الشرق من جرين رينج. وهي مستوطنة في أستراليا الغربية.

الموئل والغذاء

غابات اليوكالبتوس. يتغذى على بذور أشجار المري والجزا وبلاك بت والكاري والشيوك وسنوتوي جويل وأيضا بعض يوكالبتوس الزينة وكيب ليك المدخل.

الاحطار التي تهدد النوعية

تدمير الغابات، الحرائق في فصل الربيع موسم التناسل ونحل العسل الاوروبي الوحشي، وتوسع الشهرمان الأسترالي ويط الخشب الأسترالي الذي يحتل تجايف الاعشاش، وضربات المركبات أيضا.

المراجع

Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998) *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 278–280.

Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (1999) Food of the Forest Red-tailed Black Cockatoo *Calyptorhynchus banksii naso* in south-west Western Australia *West Aust. Nat.* **22**(3): 167–177

تصميم التنسيق: كيم سارتي


الصور: توني كيبري
الترجمة: خلود طوطج




أنثى الكوكاتو الاسود ذو الذيل الاحمر في العش



جوز شجر المري مقصوم من الكوكاتو الاسود ذو الذيل الاحمر



توزيع ثلاثة فصائل من الكوكاتو الاسود ذو الذيل الاحمر في أستراليا الغربية



التوزيع الحالي في جنوب غرب أستراليا الغربية