

# Informatie Blad

## Zwarte Roodstaart Bos Kaketoe

*Calyptorhynchus banksii naso*



Mannetje (links), Vrouwtje (midden),  
Jong (rechts)



Volwassen mannetje



Volwassenen vrouwtje

### Andere namen:

Zwarte roodstaart kaketoe.

De zuid-westerse populatie *naso* (verwijzend naar zijn grote snavel) werd zo genoemd door John Gould in 1837. Bekend bij de Noongar bevolking als "Karrak".

### Bedreigde Status:

"Kwetsbare lijst: Schema 1- West Australische wilde dieren instandhoudingsverklaring".

"Kwetsbaar: onder federale milieubescherming en biodiversiteit instandhoudingsverklaring".

Ze kwamen vroeger gebruikelijk voor, maar nu zeldzaam tot ongebruikelijk en ongelijk verdeeld over een gebied wat aanmerkelijk verminderd is. Meestal in paren of kleine koppels, zelden grote koppels (tot 200). Het is afgenomen als gevolg van de vernietiging van bossen en natuurgebieden, maar ook door de concurrentie voor nest holtes met inheemse en exotische soorten en ten gevolge van brand. Er zijn drie andersoortige van de zwarte roodstaart kaketoe in West Australië (zie kaart). Alleen de zuid-westerse populatie *naso* staat als kwetsbaar vermeld.

### Beschrijving:

Langte 53–55 cm. Gewicht 600–610 g.

**Volwassen mannetje:** glanzend zwart op een licht oranje-rode band naar het einde van de staart na, snavel donkergrijs of zwartachtig.

**Vrouwtje:** glanzend zwart, het hoofd en de dek veren lichtgeel gevlekt; borst en buik oranje-geel gestreept; staart smal gestreept met oranje-gele (meer oranje) dek veren onder de staart; snavel licht grijsachtig wit.

**Jong en onvolwassen:** gelijk aan het vrouwtje maar minder lichtgele plekken op het hoofd, wangen en vleugels, doffe lichtgele balken op borst en buik, buitenste staartveren gestreept met felrood of oranjerood (weinig of geen geel) en de snavel is donkergrijs of zwartachtig.

### Roep:

Luide harde kreten "Karee", "Karrak" of "Kraak-zaak" ook "chet" geluiden en harde nasaal piepen. Mannetjes paring roep is een herhaaldelijk mechanisch "waa-waa".

### Broeden:

Nesten in holtes van de Marri, Jarrah, Wandoo, Karri and Bullich bomen. Eieren gelegd op hout snippers op de bodem van de holtes in Maart–December; 1 ei (soms 2). Incubatietijd 29–31 dagen en alleen het vrouwtje zit op het ei en broedt het kuiken. Jongen zijn bedekt met dun geel dons.

**Gemiddelde leeftijd:** 25–50 jaren.



Vrouwelijke Zwarte Roodstaart Bos Kaketoe bij het nest

### Verspreiding:

Deze soort komt voor in het vochtige en half vochtige zuid-westen; met name in heuvelachtig binnenland, ten noorden van Gingin (vroeger van Dandaragan) en ten oosten van Mt Helena (vroeger van Toodyay), Christmas Tree Well, North Bannister (vroeger van Wandering), Mt Saddleback, Kojonup, Rocky Gully, upper King River en ten oosten van de Green Range. Ze komen alleen voor in West Australië.

### Leefomgeving en voedsel:

Eucalyptus bos. Voedt zich met zaaïende Marri, Jarrah, Blackbutt, Karri, Sheoak and Snottygobble, ook sommige sier eucalyptus en ingevoerde Cape Lilac.

### Bedreigingen voor de soort:

Vernietiging van bossen, brand in het voorjaar tijdens het broedseizoen, wilde Europese honingbijen, de uitzetting van de Australische bergeend en Australische hout eend die de nest holtes overnemen, ook voertuig aanrijdingen spelen een grote rol.

### Referenties:


Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998) *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 278–280.

Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (1999) Food of the Forest Red-tailed Black Cockatoo *Calyptorhynchus banksii naso* in south-west Western Australia *West Aust. Nat.* **22**(3): 167–177


Vertaald door: Gerard & Ineke C.



Marri noten gegeten door de Zwarte Roodstaart Bos Kaketoe



Huidige verdeling in zuid-west West Australië



Verdeling van de drie Zwarte Roodstaart Kaketoe andersoortige in West Australië