



Hoja de Información

Cacatúa Fúnebre de Cola Roja del Bosque

Calyptorhynchus banksii naso



Macho (al lado izquierdo), Hembra (al centro), Juvenil (a la derecha)

Otros nombres:

Cacatúa Fúnebre de Cola Roja del Bosque.

La población del sur-oeste, de la especie *naso* (en referencia a su pico grande) fue nombrada por John Gould en 1837. Conocida por la gente Noongar como "Karrak".

Estado de amenaza:

"Listada vulnerable: Lista 1 - La Ley de Conservación de Vida Silvestre en Australia Occidental".

"Vulnerable bajo la Protección Federal Ambiental y Conservación de la Biodiversidad".

Antes era común, pero ahora es rara o poco común y de distribución irregular en un rango que se ha vuelto notablemente reducido.

Generalmente en parejas o pequeñas bandadas, rara en bandadas grandes (hasta 200). Se ha disminuido debido a la destrucción de los bosques y montes, también la competencia de huecos de nido con especies nativas y exóticas y el impacto de la quema de los bosques. Hay tres subespecies de cola roja, Cacatúa Fúnebre en el oeste de Australia (ver mapa). Sólo la población *naso*, al sur-oeste, está en la lista como Vulnerable.

Descripción:

Longitud de 53 a 55 cm. Peso 600 a 610 g.

Macho adulto: negro brillante con excepción de banda brillante de color naranja-rojo hacia la punta de la cola, pico gris oscuro o negruzco.

Hembra: negra brillante, la cabeza y coberteras de las alas manchadas de amarillo pálido, pecho y vientre barrado con naranja y amarillo, cola estrecha con bandas de color amarillo anaranjado (más de naranja) en coberteras subcaudal; pico grisáceo pálido blanco.

Juvenil e inmaduro: similar a la hembra, excepto con menos puntos de color amarillo pálido en la cabeza, las mejillas y las alas, sin brillo, barras de color amarillo pálido en el pecho y el vientre, las plumas externas de la cola de color rojo brillante o rojo naranja (poco o ningún color amarillo) y gris oscuro o pico negruzco.

Canto:

Fuertes gritos roncros "Karee", "Karrak" o "Krar-Raak" también "jet" y los sonidos nasales severas sibilancias. Llamada del macho es un mecánico repetido "waa waa".

Reproducción:

Anidan en huecos de Marri, Jarrah, Wandoo, Karri y árboles Bullich. Los huevos son puestos sobre viruta o corteza fina de árbol en la parte inferior del hueco entre marzo y diciembre; embrague 1 (rara vez 2). Período de incubación de 29–31 días y sólo la hembra incuba y cría los polluelos. Las crías cubiertas en color amarillo escaso abajo.

Plazo de vida: 25–50 años.



Macho adulto



Hembra adulta



Hembra Cacatúa Fúnebre de Cola Roja del Bosque en su nido



Nueces Marri masticadas por la Cacatúa Fúnebre de Cola Roja del Bosque

Distribución:

Esta subespecie se produce en el húmedo y subhúmedo sur-oeste, principalmente en el interior montañoso, al norte de Gingin (antes de Dandaragan) y al este el Monte Helena (antes de Toodyay), Árbol de Navidad Bueno, Norte Bannister (antes de errante), el Monte de Saddleback, Kojonup, Quebrada de roca, parte alta del río Rey y al este de la Cordillera de verde. Es endémico de Australia Occidental.

Hábitat y la alimentación:

Los bosques de eucalipto. Se alimenta plantas jouenes de Marri, Jarrah, Blackbutt, Karri, Sheoak y Snottygobble, también algunos eucaliptos ornamentales y la introducida Cape Lilac.

Las amenazas a la especie:


La destrucción de los bosques, los incendios en primavera durante la temporada de reproducción, las abejas Europeas silvestres, la expansión de los patos arboreos Australianos (Australian Shelduck y Australian Wood Duck) que se posesionan de los hueos para nidar y también son golpeados y muertos por vehículos.

Referencias bibliográficas:


Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998) *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 278–280.

Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (1999) Food of the Forest Red-tailed Black Cockatoo *Calyptorhynchus banksii naso* in south-west Western Australia *West Aust. Nat.* **22**(3): 167–177

Traducido por: Scarlett T



Distribución corriente en el sur-oeste de Australia Occidental



Distribución de tres subespecies de la Cacatúa Fúnebre de Cola Roja del Bosque en la parte Occidental de Australia