

Information Sheet

Brown Booby

Sula leucogaster

Other names:

White-bellied Booby. The name Booby has its origins in the Spanish 'bobo' – which means stupid – and refers to their lack of fear of man, making them easy to catch.

Threatened Status:

Not threatened and one of the most widespread and common of the boobies.

Description:

A medium-sized seabird with long, narrow pointed wings and a conical bill. Length 70–80 cm and wingspan 1.35 m.

Adults are very dark brown, except for white lower breast and belly. The bill is greyish white and the bare skin of face and throat is blue in males and mostly yellowish in females. Legs and feet yellow.

Juvenile birds are duller brown above and with dirty white underparts.

Call:

The female utters a honking 'kaak-kaak-kaak' and the male a whistling or hissing 'choof-choof-choof' like a steam engine. Young birds in nests grunt and rattle their bills.

Breeding:

The nest is a small scrape on bare ground or a rough bowl of twigs, seaweed and feathers loosely assembled around the scrape. On Christmas Island they favour the ledges of sea cliffs, bare areas of coast and under trees or shrubs in forest areas. Breeding occurs mainly in April–May and the eggs, usually two, are pale blue with a white chalky coating, but become nest stained very quickly. Both adults share in nest duties and the eggs are incubated under the webs of the feet. The newly hatched chick is naked with slaty grey skin and closed eyes, but becomes downy white in two weeks.

Life span: Probably more than 30 years.

Distribution:

Breeding on islands in the tropical Indian and west Pacific Oceans. In the eastern Indian Ocean breeding on Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Ashmore Reef and islands off north-west Australia

Habitat and food:

The Brown Booby is strictly a marine species feeding both well out to sea and in inshore waters. Their prey which is fish, especially flying fish, and squid is caught mainly by plunge-diving, but they can use the wings and feet for propulsion underwater.



Adult Brown Boobies and downy chicks

Ron Johnstone

Department of Terrestrial Vertebrates

© Western Australian Museum, March 2016

Images: Ron Johnstone. Layout: Kim Sarti.



WESTERN AUSTRALIAN
museum

Lembar Informasi



Angsa-batu coklat

Sula leucogaster



Induk yang sedang mengerami telur



Induk yang sedang mengasuh



Anakan



Individu dewasa dan muda

Nama Lain:

Angsa batu perut-putih; Camar-angguk coklat. "Booby" berasal dari bahasa Spanyol "Bobo" yang berarti bodoh, berkaitan dengan sifatnya yang tidak takut akan manusia, menyebabkan jenis ini mudah ditangkap.

Status Ancaman:

Jenis ini tidak termasuk jenis yang terancam dan salah satu jenis Angsa batu yang tersebar luas dan umum.

Deskripsi:

Jenis burung laut yang berukuran sedang dengan sayap panjang dengan ujung meruncing dan paruh berbentuk kerucut. Panjang tubuh 70–80 cm dan rentang sayap 1.35 m.

Dewasa berwarna coklat gelap, kecuali dada dan perut berwarna putih. Paruh berwarna putih kehijauan dan kulit muka berwarna biru pada jantan dan kekuningan pada betina. Kaki dan jari berwarna kuning.

Remaja bagian atas bertotol coklat dan bagian bawah berwarna putih kotor.

Suara:

Betina mengeluarkan suara 'kaak-kaak-kaak' dan jantan seperti bersiul atau berdesis 'choof-choof-choof' seperti mesin uap. Burung muda akan mengeluarkan suara seperti mendengkur sambil memainkan paruh.

Berbiak:

Sarang berupa lekukan kecil di tanah atau terdiri dari kumpulan ranting, rumput laut dan bulu yang dikumpulkan di sekitar lekukan. Di Pulau Christmas, sarang berada di bagian tepi karang, di atas tanah pada daerah pantai, di bawah pohon atau semak di kawasan hutan. Musim kawin terjadi pada bulan April-Mei dan telur terdiri dari dua butir berwarna biru pucat dengan lapisan seperti kapur, menyebabkan noda pada sarang dengan sangat cepat. Kedua induk akan bergantian mengerami telur dan akan dierami di bawah selaput jari. Angsa batu yang baru menetas belum memiliki bulu dengan kulit berwarna abu-abu kelabu dan mata belum terbuka, namun akan tumbuh bulu putih halus setelah dua minggu.

Masa Hidup: Kemungkinan bisa hidup lebih dari 30 tahun

Distribusi:

Berbiak di pulau-pulau di Laut Hindia dan laut Pasifik. Di Samudera Hindia bagian timur berbiak di Pulau Christmas, Pulau Keeling, Pulau Ashmore Reef dan pulau-pulau pada Australia bagian barat laut.

Habitat dan Pakan:

Jenis ini merupakan jenis burung laut dengan mencari makan di laut dan di perairan pantai. Mangsa berupa ikan, terutama ikan terbang dan cumi-cumi yang didapatkan dengan cara masuk ke laut dan menyelam, namun jenis ini dapat menggunakan sayap dan kaki untuk bergerak di bawah air.

Diterjemahkan oleh: Fransisca Noni Tirtaningtyas
(www.burung-nusantara.org)

Ron Johnstone

Department of Terrestrial Vertebrates

© Western Australian Museum, March 2016

Images: Ron Johnstone. Layout: Kim Sarti.



WESTERN AUSTRALIAN
museum



資料介紹

棕色鰹鳥

Sula leucogaster

別名:

又名白腹鰹鳥。英文名字 "Booby" 是因西班牙文的 "bobo" 而起，意思是愚蠢。因為鰹鳥不害怕人類，使他們很容易被捕捉。

保育狀態:

無危。是分佈最廣泛及最常見的鰹鳥。

描述:

屬於中等身形的海鳥，有狹長且尖的翅膀，以及圓錐形的喙。身長 70-80 厘米，翼展 1.35 米。

成鳥 十分深的棕色，但下胸腹是白色的。喙是灰白色，雄性的臉部皮膚和喉嚨均為藍色，而雌性的大多偏黃。腿及腳為黃色。

雛鳥 上身為沉棕色，下身為髒白色。

叫聲:

雌性發出 "卡-卡-卡" 的叫鳴聲，雄性則發出吹哨聲或如蒸氣火聲般的 "挫-挫-挫" 聲。幼鳥在巢發出呼嚕聲或用喙製造出咯咯聲。

繁殖:

鳥巢是地上的一個空的小坑；或是用樹枝，海草和羽毛圍繞著坑洞，形成碗形的巢。在聖誕島上，牠們喜歡在海邊懸崖、沿岸的空地、森林內的大樹下或灌木築巢。通常在四至五月繁殖。一般產下兩隻淺藍並帶有蒼白外層的蛋，但很快就被染成鳥巢的顏色。父母共同分擔照顧鳥巢的任務，蛋會放在蹠下孵化。新孵出的雛鳥是赤裸裸的，有深藍灰的的皮膚和雙眼緊閉著，兩星期內便會變成柔白色。

壽命: 多於30年。

分佈:

在熱帶印度洋和西太平洋的島嶼上繁殖。或在聖誕島、科科斯群島、阿什莫爾礁和西北澳大利亞外的島嶼。

棲地與食物:

棕色鰹鳥是在大海和近岸水域捕食的能手。牠們主要利用急跌跳水的技能捕魚，尤其是飛魚，和魷魚。牠們也可以用翅膀和腳在水底推進。

翻譯: Tsz Yu Peggy Cheung



成年棕色鰹鳥和白色雛鳥

Ron Johnstone

Department of Terrestrial Vertebrates

© Western Australian Museum, March 2016

Images: Ron Johnstone. Layout: Kim Sarti.



WESTERN AUSTRALIAN
museum