

Information Sheet

White-tailed Tropicbird

Phaethon lepturus



Other names:

Yellow-billed Tropicbird and Golden Bosunbird (restricted to golden form on Christmas Island).

Threatened Status:

Not globally threatened, but on some islands a number of suitable breeding sites have been lost. On Christmas Island rats, feral cats and Yellow Crazy Ants *Anoplolepis gracilipes* are major threats.

Description:

The White-tailed Tropicbird is smaller and lighter than its close relative the Red-tailed Tropicbird but both have an amazing capacity for sustained flight. The very distinctive golden form of the White-tailed Tropicbird on Christmas Island, the so called Golden Bosun, is one of the most spectacular seabirds of our region.

Adult is white (with or without a weak to strong apricot or orange-yellow tinge), except for a black spot in front of the eye and extending over the eye to ear forming a facial mask. On Christmas Island only about 10% of the population are white. Extensive black on upperwing (on outer primaries) and on inner secondaries forming a conspicuous diagonal black bar on otherwise white wing. Long central tail feathers or streamers. Bill olive to yellow, legs greenish white and claws and ends of toes black.

Juvenile has blackish bill, lacks tail streamers and is extensively barred blackish on upperparts.

Call:

A crackling or rattling 'keyrrok' usually given in pursuit display flights over the breeding areas also a harsh scream at nest.

Breeding:

Nests in a variety of situations including tree hollows, among buttress roots, in cliff cavities and holes in limestone pinnacles. Breeding more or less continuous, single egg mostly white heavily marked with dark purplish brown. Both adults share in incubation and feeding the chick.

Life span: Probably around 40 years.

Distribution:

In the eastern Indian Ocean occurs on Christmas Island, Cocos-Keeling Islands, Ashmore Reef and Rowley Shoals. The golden form is only recorded from Christmas Island where they are found throughout the island from coast to inland plateau.

Habitat and food:

Tropical waters well offshore. Its food consists mainly of squid and flying fish.



Ron Johnstone

Department of Terrestrial Vertebrates

© Western Australian Museum, March 2016

Images: Peter Mortimer, Keith Lightbody and Eric Tan.

Layout: Kim Sarti.



WESTERN AUSTRALIAN
museum

Lembar Informasi

Buntut-santet Putih

Phaethon lepturus



Status Ancaman:

Tidak terancam secara global, namun pada di beberapa pulau keberadaan lokasi berbiak telah hilang. Ancaman utama di Pulau Christmas berupa tikus, kucing kampung dan jenis Semut gila kuning *Anoplolepis gracilipes*.

Deskripsi:

Jenis ini berukuran lebih kecil dan lebih terang daripada jenis kerabatnya yaitu Buntut-sate Merah namun keduanya memiliki kemampuan yang hebat saat terbang. Pada jenis yang memiliki warna kuning emas di Pulau Christmas, disebut *Golden Bosun*, merupakan salah satu burung laut yang paling spektakuler di Pulau Christmas.

Dewasa berwarna putih (dengan atau tanpa warna buah apricot keemasan yang tegas atau sedikit), kecuali warna hitam pada bagian depan mata hingga ke telinga membentuk seperti masker wajah. Di Pulau Christmas sekitar 10% dari populasi berwarna putih. Warna hitam yang meluas pada bagian atas sayap (bulu terluar primer) dan pada bulu sekunder bagian dalam membentuk garis hitam diagonal pada sisi sayap putih yang lain. Bulu ekor tengah panjang atau berbentuk seperti pita. Paruh jingga hingga kuning, kaki putih kehijauan dan cakar dan jari kaki hitam.

Muda memiliki paruh kehitaman, tidak memiliki ekor panjang dan terdapat warna kehitaman pada bagian atas ekor.

Suara:

Berbunyi 'keyrrok' biasanya sambil melakukan pertunjukan terbang diatas lokasi berbiak juga bunyi jeritan keras saat di sarang.

Berbiak:

Sarang berada di lubang pohon, antara akar banir, rongga tebing dan lubang pada batu kapur. Berbiak sepanjang tahun, telur berjumlah satu dengan warna putih dengan coklat gelap keunguan. Kedua induk mengerami dan memberikan makan anak.

Masa Hidup: Kemungkinan sekitar 40 tahun.

Distribusi:

Di Samudra Hindia di Pulau Christmas, Pulau Cocos-Keeling, Pulau Ashmore Reef dan Rowley Shoals. Jenis dengan warna kuning keemasan hanya teramat diseluruh pulau dari pantai hingga dataran tinggi dari Pulau Christmas.

Habitat dan Pakan:

Perairan tropis hingga lepas pantai. Makanan utama cumi dan ikan terbang.

Diterjemahkan oleh: Fransisca Noni Tirtaningtyas
(www.burung-nusantara.org)

Ron Johnstone

Department of Terrestrial Vertebrates

© Western Australian Museum, March 2016

Images: Peter Mortimer, Keith Lightbody and Eric Tan.

Layout: Kim Sarti.



WESTERN AUSTRALIAN
museum

资料片

白尾鸚

Phaethon lepturus



其他名称:

Yellow-billed Tropicbird 和 Golden Bosunbird
(只有金色的形式仅限于在圣诞岛)

威胁状态:

不是全球受威胁，但是再一些岛屿，有些适合的养殖场所已经失去了。在圣诞岛，老鼠，野猫和长足捷蚁 (*Anoplolepis gracilipes*) 是主要威胁。

描述:

白尾鸚比它的近亲(红尾鸚)更小，更轻。但是，两者都有惊人的持续飞行能力。在圣诞岛的非常特色的金色形式白尾鸚，也被称为 Golden Bosun，是本地区最壮观的海鸟之一。

成人的白尾鸚全身是白色

(具有或不具有淡到浓厚的杏或橙黄色调)，除了一个黑点在眼睛的前部分和过眼延伸到耳朵形成一面膜。在圣诞岛，只有10%的白尾鸚人口是白色。在白尾鸚的白翅膀上，有着显眼的斜黑条。这是以在上翼和内在2级的翼而形成的。具有长的中央尾羽或飘带。喙是橄榄黄，腿是绿白色，爪子和脚趾的末端是黑色。

未成年有着黑色的喙，但是没有尾巴的飘带。它们的上层部分带着广泛的黑色。

叫声:

通常在选育区域的追求显示着慌乱的“科罗”叫声。有时候在鸟巢，有着恶劣的尖叫声。

选育:

白尾鸚能在各种情况下筑巢。这包括在树洞里，板状根间，悬崖腔和在石灰岩尖塔洞之中。选育或多或少是连续的。大多数是1粒蛋，而蛋是多为白色和大量标有深紫褐色。雌和雄性的白尾鸚共享孵化和饲养小鸡。

寿命: 大概40岁

布点:

在东印度洋的圣诞岛，科科斯-基林岛，阿什莫尔礁和罗利浅滩。金色的形式只有从圣诞岛记录，而且它们占据整个岛，从东海岸到内陆高原。

栖息地和食物:

热带水域以及海洋。它们的食物主要包括乌贼和飞鱼。

翻译: 潘洁莹 (Felicia Phua)



Ron Johnstone

Department of Terrestrial Vertebrates

© Western Australian Museum, March 2016

Images: Peter Mortimer, Keith Lightbody and Eric Tan.

Layout: Kim Sarti.



WESTERN AUSTRALIAN
museum