



# Foglio informativo

## Cacatua di Baudin


*Calyptrorhynchus baudinii*



Maschio (sinistra), Femmina (destra)



Maschio adulto



Femmina adulta

### Altri nomi:

Cacatua nero di Baudin e cacatua nero dal becco lungo. Nominato in onore dell'esploratore francese Nicolas Baudin (1754–1803).

### Categoria di minaccia:

“A rischio: Lista 1 – Western Australian Wildlife Conservation Act”.  
“A rischio in base al Federal *Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act*”.

Da scarso a moderatamente comune (più numeroso all'interno del sud-ovest). Principalmente in stormi (fino a 300 esemplari), talvolta in più grandi aggregazioni (fino a 1200) se appollaiato. Negli ultimi 50 anni il numero si è ridotto, il suo basso tasso di riproduzione (0.6 pulcini per anno) non permette di rimpiazzare il grande numero di esemplari ucciso dai coltivatori di alberi da frutto.

### Descrizione:

Lunghezza 50–60 cm. Peso 560–770 g.

La parte alta del becco più stretta e più lunga del cacatua di Carnaby.

**Maschio adulto:** generalmente marrone scuro tendente al nero, il bordo delle piume è merlato di bianco scuro; le piume vicino alle orecchie sono bianco scuro; ha una banda bianca sulla coda che si interrompe a metà verso la punta; becco nero; pelle rosa intorno all'occhio.

**Femmina:** simile al maschio si differenzia perché le piume intorno all'orecchio sono di un bianco lucente tendente al giallo; il becco è grigiastro con la punta scura e pelle intorno all'occhio grigia.

### Canto:

Un corto “whicher whicher” e il verso dello stormo è “bunyip bunyip”. Nella riproduzione il canto è un ripetuto basso “arr” seguito da un fischio dal tono acuto.

### Riproduzione:

Nidifica nelle cavità di Karri, Marri, Wandoo, Tuart e Bullich. Depone le uova tra Agosto e Dicembre; la covata è di uno o due uova (di solito un solo pulcino viene allevato) e solo la femmina si prenderà cura della cova e del pulcino.

**Aspettativa di vita:** 25–50 anni.

### Distribuzione:

Vive nelle zone umide del sud-ovest, a nord di Gidgegannup, a est di Clackline, Wandering, Quindanning, Perup River, Lake Muir e King River, e a ovest della striscia occidentale della pianura costiera dello Swan River che include West Midland, Gosnells, Byford, North Dandalup, Yarloop, Wokalup e Bunbury e ancora the Stirling e Porongurup Ranges e lungo la costa sud del Waychinicup National Park. È endemico del Western Australia.



Femmina di cacatua di Baudin nel nido

**Habitat e cibo:**

Le foreste di eucalipti australi quali Jarrah, Marri e Karri. Si ciba di semi di eucalipto, Banksia, Hakea e di frutti come mele e pere. Anche nettare, boccioli, fiori e cortecce di alberi morti, in cerca di larve di coleotteri. Cerca il cibo a tutti i livelli, dal suolo alla cima degli alberi.

**Minacce alla specie:**

Deforestazione, incendi, collisione con veicoli e api melifere selvatiche europee che si impadroniscono delle cavità dove nidificare. In passato un grande numero è stato ucciso dai coltivatori di frutteti; il bracconaggio e' ancora attivo.

**Fonti:**


Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998). *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 278–280.

Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (2008). Distribution, status, social organisation, movements and conservation of Baudin's Cockatoo (*Calyptorhynchus baudinii*) in South-west Western Australia. *Records of the Western Australian Museum* 25: 107–118.

Images: Tony Kirkby      Impaginazione: Kim Sarti  
Traduzione: Alessandra Giacchi



Noci di Marri mangiate dal Cacatua di Baudin



Distribuzione attuale nel sud-ovest del Western Australia