




Hoja de Información

Cacatúa de Baudin


Zanda baudinii



Macho (a la izquierda) Hembra (a la derecha)



Macho adulto



Hembra adulta

Otros nombres:

Cacatúa Fúnebre de Baudin y Cacatúa Fúnebre de Pico Largo. Nombrado en honor del explorador francés Nicolas Baudin (1754 a 1803).

Estado de amenaza:

"Puesto en peligro de extinción: la Lista 1 – La Ley de Conservación de Vida Silvestre en Australia Occidental".

"En peligro de extinción: bajo la Protección Federal Ambiental y Conservación de la Biodiversidad".

Escasa a moderadamente común (más numerosas en el suroeste profundo). Principalmente en las aves (hasta 300), de vez en cuando las agrupaciones más grandes (hasta 1200) en dormideros. Se ha disminuido en los últimos 50 años, su baja tasa de reproducción (0.6 pollo por año) que se opone a sustituir el gran número cazados por horticultores

Descripción:

Longitud de 50–60 cm. Peso 560–770 g.

Pico superior más estrecho y más largo que la cacatúa Carnaby.

El macho adulto: café negro, plumas blancas con bordes oscuros que dan un aspecto festoneado; coberteras de oído oscuro blanco; banda blanca hacia la punta de la cola, roto en el medio; pico negro; piel desnuda alrededor del ojo rosado.

La hembra: como el macho, pero difiere en tener las coberteras de oído un brillante color blanco amarillento, pico grisáceo con la punta oscura y de la piel del ojo gris.

Canto:

Un corto "Whicher Whicher" y "Bunyip Bunyip", llamada de bandada. Llamada a la cría, un repetido bajo "arr" seguido de un silbido agudo.

Reproducción:

Anidan en huecos de Karri, Marri, Wandoo y árboles Bullich. Los huevos puestos en agosto y diciembre; incubación 1–2 (sólo un joven pollo criado) y sólo la hembra incuba y cría el pollo.

Plazo de vida: 25–50 años.

Distribución:

Se produce en las zonas húmedas y subhúmedas del sur-oeste, del norte a Gidgegannup, al este de Clackline, Wandering, Quindanning, el Río Perup, el Lago Muir y el Río Rey, y al oeste con franja oriental de la Llanera Costal de Swan incluyendo West Midland, Gosnells, Byford, Norte de Dandalup, Yarloop, Wokalup y Bunbury, también en Stirling y rangos de Porongurup y a lo largo de la costa sur del Parque Nacional de Waychinicup. Es endémico de Australia Occidental.

Hábitat y alimentación:

El sur de los bosques de eucalipto, principalmente de Jarrah, Marri y Karri. Se alimenta de semillas de eucaliptos, Banksia, Hakea y las



Hembra Cacatúa de Baudin en su nido

manzanas y las peras de fructificación. También néctar, brotes y flores y tiras de corteza de árboles muertos en busca de larvas de escarabajo. Buscan alimento en todos los niveles desde la copa del árbol hasta el suelo.

Las amenazas a la especie:

La tala de bosques para cultivar la tierras, incendios, golpeados y muertos por vehículos, las abejas silvestres que toman posesión de huecos de anidación, y en el pasado, los grandes números de la especie que han sido cazados por horticultores.

Referencias bibliográficas:


Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998). *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 278–280.

Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (2008). Distribution, status, social organisation, movements and conservation of Baudin's Cockatoo (*Calyptorhynchus baudinii*) in South-west Western Australia. *Records of the Western Australian Museum* **25**: 107–118.

Traducido por: Scarlett T



Nueces Marri masticadas por Cacatúa de Baudin



Actual distribución en sur-Oeste del estado Oeste Australiano