

ورقة المعلومات

كوكاتو كارنبي

Zanda latirostris

الاسماء الاخرى

كوكاتو كارنبي الاسود والكوكاتو الاسود قصير المنقار. سمي كوكاتو كارنبي تكريما لعالم البيض والطبيعة إيفان كارنبي (1908 – 1974)

حالة التهديد

مدرج في القائمة الحرجة: جدول رقم 1 - قانون الحفاظ على الحياة البرية في استراليا الغربية
مهدد بالانقراض: بموجب قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي الفدرالي
يتواجد بشكل غير شائع الى شائع في المناطق الرطبة من النطاق ، نادر التواجد وموزع بشكل غير مستقر في الاجزاء الجافة . يتواجد عادة على شكل أزواج أو أسراب صغيرة، وفي بعض الاحيان كأسراب كبيرة او تجمهرات تصل الى حد 5000 طائر في غير مواسم التزاوج خاصة في مزارع الصنوبر. وقد تناقص عدده خلال الخمسين سنة الماضية بسبب فقدان وتدمير الموئل خاصة إزالة الموئل على نطاق واسع في معظم مناطق الويت بيلت وغابات بانكزيا وتيوارت في سهل سوان الساحلي.

الوصف

يتراوح الطول بين 53 – 58 سم والوزن بين 500 – 790 غم
المنقار العلوي أوسع وأقصر من منقار كوكاتو بودين
الذكر البالغ: عموما أسود اللون مائل للبني واطراف الريش موشحة باللون الابيض القاتم معطيا مظهرا صديفيا.
كواسي الأذن لونها ابيض قاتم وهناك شريطا ابيضا مشقوقا بالوسط يمتد باتجاه طرف الذيل. والمنقار أسود اللون والجلد العاري حول العين وردي اللون.
الأنثى: مشابهة للذكر لكن تختلف عنه بان لون كواسي الأذن ابيضا مصفرا ، والمنقار ابيضا رماديا أو رمادي بطرف اسود وجلد العين رمادي اللون .

النداء

تغريدة قصيرة وي يو – وي يو أو نداء السرب وي لoo - وي لoo

التكاثر

يتكاثر بشكل رئيس في منطقة الويت بيلت في تجاويف جذوع اشجار الكينا القديمة ذات اللحاء الناعم بما في ذلك شجر الواندو والسالمون جَم وتيوارت وفَلْدِيد جَم والكاري إضافة إلى شجر البولش والمري. ويوضع البيض على غبار او رقائق الخشب في أسفل التجويف من أوائل شهر تموز إلى كانون الأول وتضع الأنثى بيضة او بيضتين. ويتم عادة تربية فرخ واحد فقط والأنثى فقط تحتضن وتربي الفرخ .

متوسط العمر ما بين 25 – 50 سنة

التوزيع

يتواجد في الجنوب الغربي الى الشمال من منطقة ميرتشيسون السفلى وشرقا الى نياوى وويلروي وغابة ودي ومانمانينج ودوروكوبين وبحيرة كروين والى الشرق قليلا من كوينزلاند. وهو مستوطن في استراليا الغربية.

الموئل والغذاء

أحراج وشجيرات داخل استراليا الغربية شبه القاحل. تنتقل في غير موسم التزاوج على شكل أسراب الى المناطق الساحلية خاصة مزارع الصنوبر وأحراج بانكزيا

ويشمل الغذاء ازهار ورحيق ونبور البانكزيا




أنثى (يمين) ، ذكر (يسار)



ذكر بالغ

الذكور البالغين



Adult female

الأخطار التي تهدد الأنواع

تشمل الأسباب المباشرة لتناقص المجموعات تطهير الأراضي وتجزئة الموئل (خاصة في نطاق الويت بلت)، وفقدان الأشجار ذات التجاويف وأثر المنافسين على التجاويف بما في ذلك الجاله والكوريلاس ونحل العسل الاوروبي الوحشي والحرائق وضربات المركبات أيضا.

المراجع

Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998). *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 276–280.

Johnstone, R., Kirkby, T., Stone, P., Minton, C. (2005). White-tailed Black-Cockatoos: Identification Challenges and Changes in Distribution and Status, and links with a Community Program – Cockatoo Care. In Gole, C. (Ed.). *Carnaby's Black-Cockatoo Future Directions Symposium 2003*. Birds Australia WA, Perth.

الصورة: توني كيربي تصميم التنسيق: كيم سارتي
الترجمة: خلود طوطح



أنثى كوكاتو كارنبي في العش



جوز المَرّي ممضوغا من قبل كوكاتو



التوزيع الحالي في جنوب غرب أستراليا الغربية