

Informacja




Papuga Carnaby *Calyptrorhynchus latirostris*



Samiec (po lewej stronie),
samica (po prawej)



Dorosły samiec



Dorośla samica

Alternatywne nazwy:

Czarna Papuga Carnaby lub Czarna Papuga Krótko-dziobata. Nazwana na cześć badacza ptasich jaj i przyrodnika Ivana Carnaby (1908–1974).

Ochrona gatunku:

Zaliczone do zagrożonych –wymienione w Liście Numer 1 gatunków objętych częściową ochroną - ustawa o ochronie przyrody w stanie Zachodniej Australii.

Także zaliczone do zagrożonych na podstawie federalnej ustawy o ochronie przyrody, naturalnego środowiska i różnorodności biologicznej w całej Australii.

Częściej spotykane w bardziej wilgotnej części obszaru oznaczonego na poniższej mapie. Na bardziej suchych obszarach rzadziej spotykane niewielkie liczby tych papug. Zwykle w parach lub małych grupkach, ale od czasu do czasu można spotkać większe grupy lub nawet stada do 5,000 w sezonie poza lęgowym, głównie na sosnowych plantacjach. Liczba tych papug zmniejszyła się w ostatnich 50 latach z powodu utraty siedlisk, głównie na skutek powiększania gruntów pod uprawę roślin zbożowych oraz wycinkę lasów Banksia and Tuart na obszarze zwanym Swan Coastal Plain.

Opis:

Długość 53–58 cm. Waga 500–790 g.

Górny dziób szerszy i krótszy niż u papugi Baudin.

Dorosły samiec: głównie czarno-brązowe upierzenie, końce piór szaro-białe o muszelkowatym kształcie, krótkie pióra przy uszach także szaro-białe; przy końcu ogona biały pasek przerwany w połowie, dziób czarny, pozbawiona piór różowa skóra dookoła oczu.

Samica: podobna do samca z wyjątkiem koloru krótkich piór przy uszach, które są biało-żółte; dziób szaro-biały lub szary z czarnym końcem, skóra przy oczach szara.

Śpiew:

Krótkie dźwięki "hiiu-hiiu" lub "hiiluu-hiiluu" – nawoływanie w stadzie.

Lęgi:

Głównie w wielkim regionie upraw roślin zbożowych Zachodniej Australii w dziuplach starych pozbawionych kory drzewach eukaliptusowych takich jak Salmon Gum, Wandoo, Tuart, Flooded Gum, Karri a także Bullich and Marri. Jajka składane na pyłe lub ścinkach drzewnych na dzień wyłobienia od początku lipca do grudnia. Wylęgają się 1 lub 2 pisklęta (zwykle tylko jedno pisklę dorasta) i tylko samica wysiaduje i opiekuje się pisklęciem.

Długość życia: 25–50 lat.

Zasięg występowania:

Występuje w południowo-zachodnim i północnym rejonie to dolnego rejonu Murchison i na wschód do Nabawa, Wilroy, Waddi Forest, Manmanning, Durokoppin, Lake Cronin oraz na wschód od Condingup. Te papugi są typowe dla Zachodniej Australii.



Samica papugi Carnaby w gnieździe



Nasiona drzew Marri pogryzione przez papugi Carnaby

Środowisko i żer:

Obszary leśne i zarośla pokrywające półpustynny środek Zachodniej Australii. W okresie poza lęgowym stada tych papug wędrują do przybrzeżnych terenów, w szczególności do plantacji sosnowych i lasów drzew Banksia. Żerują na kwiatkach, nektarze i nasionach drzew Banksia, Dryandra, Hakea, Eucalyptus, Corymbia, Grevillea, a także nasionach sosny Pinus, drzew orzechowych, szczególnie migdałowych i macadamia. Sok i miąższ jabłek i persimonów oraz larwy insektów także stanowią ich pożywienie.

Zagrożenie dla gatunku:


Bezpośrednimi przyczynami spadku liczebności tych papug jest wycinka lasów i zarośli na cele rolnicze, a co za tym idzie rozdrobnienie siedlisk (szczególnie na obszarach przeznaczonych pod uprawę roślin zbożowych), utrata drzew z dziuplami i konkurencja innych ptaków takich jak Galah, Corellas. Inwazja zdziczałych europejskich pszczoł, pożary i zderzenia z pojazdami także mają ujemny wpływ na liczebność tych papug.

Przypisy:

Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998). *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 276–280.

Johnstone, R., Kirkby, T., Stone, P., Minton, C. (2005). White-tailed Black-Cockatoos: Identification Challenges and Changes in Distribution and Status, and links with a Community Program – Cockatoo Care. In Gole, C. (Ed.). *Carnaby's Black-Cockatoo Future Directions Symposium 2003*. Birds Australia WA, Perth.

Images: Tony Kirkby Layout design: Kim Sarti
Tłumaczyła: Maria Godwich



Obecny zasięg występowania papug Carnaby na południowo-zachodnim rejonie Zachodniej Australii