

ورقة المعلومات

الكوكاتو الأسود ذو الذيل الأحمر

Calyptorhynchus banksii naso

الأسماء الأخرى

الكوكاتو الأسود ذو الذيل الأحمر
وقد أطلق جون جولد عام 1837 على سكان الجنوب الغربي اسم "الناسو" (نسبة إلى منقاره الضخم). ويعرف عند شعب النونجار باسم "كاراك".

حالة التهديد

مدرج في القائمة الحرجة: جدول رقم 1 - قانون الحفاظ على الحياة البرية في
أستراليا الغربية
مهدد بالانقراض: بموجب قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي الفدرالي.

وقد كان شائعاً في السابق، لكنه الآن نادر إلى غير شائع وموزع بشكل غير مستقر على نطاق أصبح منخفضاً بشكل ملحوظ. يتواجد عادة على شكل أزواج أو أسراب صغيرة، نادراً بأسراب كبيرة (تصل إلى 200). وقد تناقص بسبب تدمير الغابات والأراضي الحرجية، والمنافسة على تجاويف الأعشاش مع الأنواع المحلية والأجنبية أيضاً، وتأثير الحرائق. هناك ثلاث فصائل فرعية من الكوكاتو الأسود ذو الذيل الأحمر في أستراليا الغربية (انظر الخريطة). وسكان الجنوب-الغربي "الناسو" هم فقط المدرجون كمهددون بالانقراض.

الوصف

يتراوح الطول بين 53 - 55 سم والوزن بين 600-610 غم.
الذكر البالغ: أسود لامع ما عدا شريط أحمر- برتقالي باهت باتجاه طرف الذيل، والمنقار رمادي داكن أو مسود.
الأنثى: أسود لامع، الرأس وأغطية الجناح مبرقعة بأصفر باهت، الصدر والبطن موشح بخطوط برتقالي- أصفر والذيل عليه شريط ضيق برتقالي- أصفر (الغالب برتقالي) على أغطية أسفل الذيل، المنقار أبيض رمادي باهت.
الأحداث وغير البالغين: على غرار الأنثى باستثناء البقع الصفراء الباهتة على الرأس والخددين والأجنحة فهي أقل، خطوط كثيفة باهتة صفراء على الصدر والبطن، وريش الذيل الخارجية مخططة بألوان زاهية من الأحمر أو البرتقالي المحمر (قليلاً من الأصفر أو بدون) والمنقار رمادي داكن أو مسود.

النداء

صيحات عالية خشنة "كاربي"، "كاژاك" أو "كرار-راك" وأيضاً أصوات "ثثت" و"وا". وصفير أنثى خشن. نداءات الذكر للتزاوج عبارة عن تكرار ميكانيكي لصوت "وا".

التكاثر

يعشش في تجاويف جذوع أشجار المري والجرا والواندو والكاربي والبولش. يوضع البيض على رقائق الخشب في أسفل التجويف من شهر آذار إلى كانون الأول وتضع الأنثى بيضة (نادراً بيضتين). فترة الحضنة من 29 - 31 يوم والأنثى فقط تحتضن وتربي الفرخ. الفقس يكون مغطى بريش أصفر متناثر.

متوسط العمر: 25 - 50 سنة



حدث (يمين)، أنثى (وسط)، ذكر (يسار)



ذكر بالغ



أنثى بالغة

التوزيع

تتواجد هذه الفصيلة في مناطق الجنوب الغربي الرطبة وشبه الرطبة، بشكل رئيسي في مرتفعات الداخل، إلى الشمال من دجن دجن (دندرجان Dandaragan سابقا) وإلى الشرق من ماونت هيلينا (توداي Toodyay سابقا)، كريسماس تري ول، بالقرب من بروكتون ونورث بانيستر (وانديرنج سابقا) وماونت سادلياك وكودجوتب وروكي جلي وأعلى نهر كينج وإلى الشرق من جرين رينج. وهي مستوطنة في أستراليا الغربية.

الموئل والغذاء

غابات اليوكاليتوس. يتغذى على بذور أشجار المري والجرا وبلاد بت والكارى والشيوك وسنوتى جويل وأيضا بعض يوكاليتوس الزينة وكيب ليلك المدخل.

الاطار التي تهدد النوعية

تدمير الغابات، الحرائق في فصل الربيع موسم التناسل ونحل العسل الاوروي الوحشي، وتوسع الشهرمان الأسترالي ويط الخشب الأسترالي الذي يحتل تجايف الاعشاش، وضربات المركبات أيضا.


المراجع

Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998) *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 278–280.

Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (1999) Food of the Forest Red-tailed Black Cockatoo *Calyptorhynchus banksii naso* in south-west Western Australia *West Aust. Nat.* **22**(3): 167–177

الصورة: توني كيبري تصميم التنسيق: كيم سارتي


الترجمة: خلود طوطح




أنثى الكوكاتو الاسود ذو الذيل الاحمر في العش



جوز شجر المري مقضوم من الكوكاتو الاسود ذو الذيل الاحمر



توزيع ثلاثة فصائل من الكوكاتو الاسود ذو الذيل الاحمر في أستراليا الغربية



التوزيع الحالي في جنوب غرب أستراليا الغربية