

## Czarna papuga czerwono-ogonowa - leśna *Calyptorhynchus banksii naso*



Samiec (po lewej stronie), samica (Pośrodku),  
młody osobnik Juvenile (po prawej stronie)



Dorosły samiec



Dorośla samica

### Alternatywna nazwa:

Czarna papuga czerwono-ogonowa  
Populacja tych papug w południowo-zachodniej części mających w swojej łacińskiej nazwie słowo *naso* (odnoszące się do ich dużych dziobów). Nazwa ta została nadana przez Johna Goulda w 1837 roku. Lokalny szczepek Aborygenów, Noongar, nazywa je 'Karrak'.

### Ochrona gatunku:

Zaliczone do zagrożonych – wymienione w Liście Numer 1 gatunków objętych częściową ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody w stanie Zachodniej Australii.

Także zaliczone do zagrożonych na podstawie federalnej ustawy o ochronie przyrody, naturalnego środowiska i różnorodności biologicznej w całej Australii.

Papugi te były dość liczne, ale obecnie rzadko spotykane w różnych rejonach. Zwykle występują w parach lub w małych grupkach, rzadko w większych stadach (do 200). Ich liczba zmniejszyła się znacznie ze względu na coraz mniejszą powierzchnię lasów, a także obecność innych gatunków ptaków, rodzimych i egzotycznych, które zasiedlają te same gniazda, oraz na skutek pożarów. Występują trzy podgatunki tych papug w Zachodniej Australii (spójrz na załączoną mapę), ale tylko południowo-zachodnia populacja tych papug *naso* jest zaliczona do zagrożonych.

### Opis

Długość 53–55 cm. Waga 600–610 g.

**Dorosły samiec:** błyszczące czarne upierzenie za wyjątkiem ostrego pomarańczowo-czerwonego paska przy końcu ogona, dziób ciemno szary lub zbliżony do czarnego.

**Samica:** błyszczące czarne upierzenie, głowa i krótkie pióra przy uszach pokryte jasno żółtymi plamkami; pierś i brzuch z poprzecznymi pomarańczowo-żółtymi smugami; ogon z wąskim paskiem pomarańczowo-żółtym (bardziej zbliżony do kolorem do pomarańczowego) na krótkich piórach podogonia; dziób jasny szaro-biały.

**Młode papugi:** podobne do samic z wyjątkiem mniej licznych jasno żółtych plam na głowie, po bokach dziobu i skrzydłach, jasne żółte smugi na piersi i brzuchu, wierzchnie pióra na ogonie z czerwonymi lub pomarańczowo-czerwonymi smugami (mało lub wcale żółtego koloru), dziób ciemno szary lub zbliżony do czarnego.

### Śpiew:

Głośne szorstkie okrzyki "Karee", "Karrak" or "Krar-raak" także odgłosy "czit" i chropowaty nosowy świszczący oddech. W porze lęgów samce wydają mechaniczne powtarzające się dźwięki "taa-taa".

### Lęgi:

Gniazda w dziuplach w drzewach Marri, Jarrah, Wandoo, Karri and Bullich. Jajka są składane na ścinkach drzewnych na spodzie dziupli w okresie marzec - grudzień; jedno jajko (rzadko 2). Okres wylęgania 29–31 dni. Tylko samica wysiaduje i opiekuje się pisklęciem, które jest pokryte rzadkim żółtawym puchem.


**Długość życia:** 25–50 lat.



Samica Czarnej papugi czerwono-ogonowej w gnieździe



Czarne papugi czerwono-ogonowe



Obecny zasięg występowania w południowo-zachodnim rejonie

### Zasięg występowania:

Ten podgatunek występuje w wilgotnym i mniej wilgotnym centralnym rejonie południowo-zachodnim, głównie na pagórkowatym terenie na północ od miejscowości Gingin (poprzednio od Dandaragan) i na wschód do miejscowości Mt Helena (poprzednio do Toodyay), Christmas Tree Well, blisko Brookton, North Bannister (poprzednio od Wandering), Mt Saddleback, Kojonup, Rocky Gully, górny King River i na wschód do Green Range. Występuje tylko w Zachodniej Australii.

### Środowisko i żer:

Lasy eukaliptusowe. Żerują na nasionach drzew Marri, Jarrah, Blackbutt, Karri, Sheoak **and** i Snottygobble, także eukaliptusów hodowane dla celów ozdobnych. Także nasiona drzewa o nazwie Cape Lilac, które nie jest rodzimym gatunkiem drzewa w Zachodniej Australii, są ich pożywieniem

### Zagrożenie dla gatunku:


Wycinka lasów, pożary w okresie lęgowym, zdziczałe europejskie pszczoły, i ekspansja innych ptaków takich jak Australian Shelduck i Australian Wood Duck, które zajmują dziuple, a także zderzenia z pojazdami.

### Przypisy:

Johnstone, R.E. and Storr, G.M. (1998) *Handbook of Western Australian Birds*. Volume 1 – Non-passerines (Emu to Dollarbird). Western Australian Museum pp. 278–280.

Johnstone, R.E. and Kirkby, T. (1999) Food of the Forest Red-tailed Black Cockatoo *Calyptorhynchus banksii naso* in south-west Western Australia *West Aust. Nat.* **22**(3): 167–177

Images: Tony Kirkby Layout design: Kim Sarti  
Tłumaczyła: Maria Godwich



Obecny zasięg występowania trzech podgatunków Czarnej papugi czerwono-ogonowej w południowo-zachodnim rejonie Zachodniej Australii