

Information Sheet

White Tern

Gygis alba



Adult White Tern, Cocos Islands.



A single egg is laid on a branch or palm frond.



Juvenile White Terns are quiet at the nest sites.



Pair of White Terns at nest site, West Island.

Other names:

Fairy Tern, White Noddy and Cocos Fairy Tern.

Status:

This beautiful tern is a common breeding resident on North Keeling Island and on islands in Cocos group including West, South, Home and Horsburgh. Birds appear to remain around the islands in both inshore and offshore waters throughout the year.

Their diet includes small fish and squid that move to the surface at night which suggests that dawn and dusk feeding is important as the birds pick food from the surface, or just below the surface, of the water. They are inquisitive and tame.

Description:

Length 28–33 cm, wingspan 66–78 cm.

Adults (sexes similar) are completely white except for a small dusky patch in front of the eye and the shafts of the wing and tail feathers which are blackish. When perched, the wing extends well beyond the shallow forked tail. The iris is dark brown, the eye ring blackish and these together with the dusky lore patch give a large eyed appearance. The bill is slightly upturned and is black grading to dark blue at the base and the legs and feet are greyish-blue.

Juveniles are similar to adults except for orange-buff to gingery tips to feathers of forehead, crown, hindneck and centre of the throat and breast and the upper back and wing feathers are finely marked with dull brown. This mottled pattern is soon lost with wear.

Call:

A guttural “*haachhaach*” and a clicking sound.

Breeding:

Breeding is recorded throughout the year, but with seasonal peaks.

A single egg is laid on a bare branch of a tree including Cocos Ironwood (*Calophyllum*), Octopus Bush (*Argusia*) and Tree Heliotrope (*Tournefortia*), carefully balanced in knotholes, against the midrib on a horizontal section of a coconut palm frond or on tree stumps, from 3–8 metres above ground.

Eggs are buffy-white to olive colour and variably blotched and scrawled with grey and brown. Hatchlings are covered with greyish down with brownish tips giving a mottled appearance. Both parents share in the incubation of the egg and in feeding young.

Life Span: 20–25 years.

Distribution:

Restricted to tropical zones of the Atlantic, Indian and Pacific Oceans. In the Australian region breeding on Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island, Lord Howe Island and Norfolk Island.

Lembar Informasi



Dara-laut putih

Gygis alba



Dewasa Dara-laut putih. Pulau Cocos

Status:

Jenis dara laut yang terbilang indah ini merupakan jenis residen yang umum terdapat di Pulau Keeling bagian utara dan di pulau-pulau Cocos termasuk bagian barat, selatan, dan Horsburgh. Jenis ini biasanya berada sekitar pulau pada perairan pantai dan lepas pantai sepanjang tahun.

Pakan jenis ini termasuk ikan kecil dan cumi yang berada di permukaan pada malam hari yang menunjukkan bahwa pada waktu malam dan pagi hari adalah waktu yang tepat untuk mencari makan. Termasuk jenis yang memiliki rasa ingin tahu dan jinak.

Deskripsi:

Panjang tubuh 28–33 cm, rentang sayap 66–78 cm.

Dewasa (jantan dan betina) berwarna putih kecuali warna gelap pada bagian depan mata dan batang bulu sayap dan ekor yang berwarna kehitaman. Ketika bertengger, sayap memanjang diantara ekor yang menggarpu. Iris coklat gelap, lingkaran mata dan keang kehitaman sehingga mata seperti berukuran besar. Paruh tajam agak sedikit melengkung ke atas dan gradasi hitam hingga biru gelap pada bagian bawah dan kaki dan jari biru keabuan.

Remaja sama dengan dewasa kecuali pada ujung bulu bagian mahkota, dahi, leher berwarna jingga kekuningan dan bulu sayap berbintik coklat keabuan. Bintik ini nantinya akan hilang bersamaan dengan bulu tua.

Suara:

Sebuah suara parau “*haachhaach*” dan suara klik

Berbiak:

Berbiak sepanjang tahun, namun terdapat puncak musim berbiak.

Satu butir telur terletak di cabang pohon, termasuk pohon *Calophyllum*, *Argusia* dan *Tournefortia*, berada diantara batang daun palem yang menyatu atau di tunggul pohon dengan jarak 3–8 meter dari tanah.

Telur berwarna putih mengkilap sampai zaitun dengan variasi noda dan coretan abu-abu dan coklat. Anakan tertutupi oleh bulu halus dan ujung bulu berwarna keabuan sehingga tampak berbintik-bintik. Kedua induk mengerami telur dan memberi makan anakan.

Masa hidup: 20–25 tahun.

Distribusi:

Terbatas pada zona tropis dari Laut Atlantis, Hindia dan Pasifik. Di wilayah Australia berbiak di Pulau Cocos (Keeling), Pulau Christmas, Pulau Lord Howe dan Pulau Norfolk.

Diterjemahkan oleh: Fransisca Noni Tirtaningtyas
(www.burung-nusantara.org)



Satu buah telur terletak di batang atau tunggul palem



Burung muda diam di lokasi sarang



Sepasang dara-laut putih di sarang di West Island.

Ron Johnstone

Department of Terrestrial Vertebrates

© Western Australian Museum, March 2016

Images: Ron Johnstone and Pam Jones. Layout: Kim Sarti.



WAM

WESTERN
AUSTRALIAN
MUSEUM

资料片

白玄鸥

Gygis alba



飞行的成年白玄鸥

其他名称:

童话燕鸥, 白诺迪和科科斯童话燕鸥。

威胁状态:

这优美的玄鸥是在北基灵岛和科科斯的某些岛屿, 包括西, 南和霍士礁的常见养殖的居民。鸟儿似乎多年来保持在海岛附近的近岸和近海海域。它们的饮食包括在晚上移动到水面的小型鱼类和乌贼。这表明, 黎明和黄昏馈送是重要的。因为鸟儿从水面或水的水面下挑食品。它们是好奇和驯服的鸟儿。

描述:

长度28至33厘米, 翼展66至78厘米

成年的雌性和雄性白玄鸥都是完全白色的, 除了在眼睛前面的小昏暗的补丁, 并在机翼和尾部羽毛的轴是黑色的。栖息时, 机翼远远超出了浅分叉的尾巴。虹膜是暗褐色, 环眼是黑色。这2个特征与昏暗的补丁一起给予大眼睛的外观。喙是稍微向上倾斜和是黑色的分级, 以深蓝色为基地。腿和脚是灰蓝色。

未成年和成年的白玄鸥很相似, 除了前额, 鸟冠, 后颈和厚和胸部的中间的羽翼是橙迷。背部的上方和翼羽都有细标的暗褐色。这斑驳的图案很快与磨损丢失。

叫声:

“呵呵”的喉音和咔哒声。

选育:

选育的记录是一年四季, 但与季节性高峰。

一粒蛋被下在树枝上, 树种包括 Cocos Ironwood (*Calophyllum*), Octopus Bush (*Argusia*) and Tree Heliotrope (*Tournefortia*).

蛋很小心翼翼的均衡在椰子树

植物体或树桩的结孔, 大概3至8米高出地面。

白玄鸥的蛋可以是棕黄色到白色或橄榄色, 并有灰色和褐色的斑点。稚龟都覆盖着灰色下降给予一种斑驳的外观。父母双方共享孵蛋和喂养幼小的白玄鸥。

寿命: 20至25岁

布点:

仅限于大西洋, 印度洋和太平洋的热带地区。在澳大利亚地区, 繁殖发生在科科斯岛, 圣诞岛, 豪勋爵岛和诺福克岛。

翻译: 潘洁莹 (Felicia Phua)



一对白玄鸥在它们的巢址



一粒蛋下在树枝或藻体



成年白玄鸥孵蛋。白玄鸥通常在巢址是很安静的。

Ron Johnstone

Department of Terrestrial Vertebrates

© Western Australian Museum, March 2016

Images: Ron Johnstone and Pam Jones. Layout: Kim Sarti.



WESTERN
AUSTRALIAN
MUSEUM